


Management hyperbilirubinémie před dimisí


Gestační věk 38⁺⁰ a více



Věk (hod.)	48	72	96	120
Dimise při TKI (Bi)	< 220	< 260	< 290	< 310
Kontrola Bi při TKI	≥ 220	≥ 260	≥ 290	≥ 310
Fototerapie při Bi	≥ 260	≥ 300	≥ 340	≥ 360
Ukončení FT při Bi				< 250
Dimise po FT				


Gestační věk 38⁺⁰ a více COOMBS pozitivní

Gestační věk 35⁺⁰ až 37⁺⁶



Věk (hod.)	72	96	120
Dimise při TKI (Bi)	< 230	< 250	< 260
Kontrola Bi při TKI	≥ 230	≥ 250	≥ 260
Fototerapie při Bi	≥ 260	≥ 290	≥ 308
Ukončení FT při Bi			< 200
Rebound TKI/Bi 12-24 h po ukončení FT			
Dimise při vstupu do 40 umol/l/den			

Gestační věk 35⁺⁰ až 37⁺⁶ COOMBS pozitivní



Věk (hod.)	72	96	120
Dimise při TKI (Bi)	< 190	< 210	< 210
Kontrola Bi při TKI	≥ 190	≥ 210	≥ 210
Fototerapie při Bi	≥ 230	≥ 250	≥ 260
Ukončení FT při Bi			< 150
Rebound TKI/Bi 12-24 h po ukončení FT			
Dimise při vstupu do 40 umol/l/den			